



## CALENDARIO VACUNAL DEL ADULTO

<b>Gripe</b>	-1 dosis anual en personas con indicación médica, ocupacional o epidemiológica, desde 14 a 64 años. -1 dosis anual con vacuna de inmunogenicidad aumentada en todas las personas ≥ 65 años.
<b>Neumococo (VNC13 y VNP23)</b>	-Personas de 65 años: 1 dosis de VNC13 y dosis de VNP23 a partir de los 66 años. -Si recibieron VNP23 antes de 65 años: VNC13 a los 65 y VNP23 a los 5 años de la 1ª dosis. -Desde 18 años: Inmunodeprimidos, Fístulas del LCR, Implantes cocleares, Asplenia, Enfermedad hepática crónica y antecedentes de Enfermedad Neumocócica Invasora confirmada: 1 dosis de VNC13 y otra de VNP23 a partir de las 8 semanas. (Si vacunados previamente con VNP23), 1 dosis de VNC13 con ≥ 1 año de intervalo y otra de VNP23 a los 5 años de la 1ª dosis. -Inmunocompetentes con otras patologías de riesgo tras valoración clínica: 1 dosis de VNC13. -En todas las personas ≥ 65 años residentes en instituciones o con indicación médica: 1 dosis de VNP23
<b>Tétanos-Difteria (Td)</b>	Completar la vacunación si ausente o incompleta. Dosis de recuerdo a los 60-65 años
<b>Tos ferina (dTpa)</b>	1 dosis en personal sanitario de pediatría y obstetricia hasta los 65 años y en embarazadas en el tercer trimestre
<b>Triple Vírica (TV)</b>	Completar hasta 2 dosis con intervalo mínimo de 4 semanas hasta los 35 años
<b>Varicela (VVZ)</b>	2 dosis en personas seronegativas con indicación médica, ocupacional o epidemiológica con un intervalo de 1 a 3 meses
<b>Herpes Zóster (VVZ)</b>	1 dosis en pacientes ≥ 60 años con, al menos, dos de las siguientes afecciones: Diabetes tipo I o II, EPOC, ICC e inmunocompetentes en los que se prevé inmunosupresión
<b>Meningococo C (MCC)</b>	1 dosis en personas con indicación médica o epidemiológica
<b>Haemophilus influenzae b (Hib)</b>	1 dosis en personas con indicación médica
<b>Hepatitis A (HAV)</b>	2 dosis (0-6 meses) en personas con indicación médica, ocupacional o epidemiológica
<b>Hepatitis B (HBV)</b>	-3 dosis (0-1-6) en personas con indicación médica, ocupacional o epidemiológica -3 o 4 dosis según el tipo de vacuna a utilizar en personas con insuficiencia renal, insuficiencia hepática o inmunosupresión
<b>Papiloma Humano (VPH) ✓</b>	3 dosis (0-1/2-6 meses según vacuna administrada) en mujeres con inmunodepresión y conizadas por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado CIN 2 o superior, hasta 45 años y en mujeres con Enfermedad Inflamatoria Intestinal hasta los 65 años de edad.